

Vía para abordaje por [vía transesfenoidal](#)

Indicaciones

[Tumores hipofisarios](#)

[Impresión basilar](#) en [síndrome de Klippel-Feil](#) (Bettegowda y col., 2011; Asadi-Moghaddam y col., 2012).

Bibliografía

Asadi-Moghaddam, Kaveh, Bradley A Otto, Ricardo L Carrau, and Daniel M Prevedello. 2012. "Sublabial Approach for Symptomatic Basilar Impression." *Neurosurgery* 70 (4) (April): E1054-1055. doi:10.1227/NEU.0b013e31824869a5.

Bettegowda, Chetan, Mehdi Shajari, Ian Suk, Oliver P Simmons, Ziya L Gokaslan, and Jean-Paul Wolinsky. 2011. "Sublabial Approach for the Treatment of Symptomatic Basilar Impression in a Patient with Klippel-Feil Syndrome." *Neurosurgery* 69 (1 Suppl Operative) (September): ons77-82; discussion ons82. doi:10.1227/NEU.0b013e3182160709.

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=abordaje_sublabial

Last update: **2019/09/26 22:14**

