

Abordaje transsilviano

Indicación

Aneurisma de la arteria cerebral media.

Para la exposición de las lesiones en los [ganglios basales](#) y la [ínsula](#), incluyendo la [cápsula extrema](#), [claustró](#), [cápsula externa](#), [putamen](#) y [globo pálido](#).

La resección quirúrgica de las lesiones en este territorio son de riesgo debido a su profundidad, la [elocuencia](#) y la proximidad de la cápsula interna, el tálamo, y el [área del lenguaje](#), lenguaje corteza, la arteria cerebral media distal (MCA) y las venas cerebrales medias ^{1) 2)}

véase [Abordaje transsilviano transinsular](#).

¹⁾

Bertalanffy H, Gilsbach JM, Eggert HR, Seeger W. Microsurgery of deep-seated cavernous angiomas: report of 26 cases. Acta Neurochir (Wien) 1991;108(3-4):91-99.

²⁾

Gross BA, Duckworth EA, Getch CC, Bendok BR, Batjer HH. Challenging traditional beliefs: microsurgery for arteriovenous malformations of the basal ganglia and thalamus. Neurosurgery. 2008 Sep;63(3):393-410. discussion 410-391.

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=abordaje_transsilviano

Last update: **2019/09/26 22:12**

