

La clinoides media es una prominencia ósea que surge del cuerpo del esfenoides en el margen antero-lateral de la silla turca.

En TAC se ha identificado en el 60% de las exploraciones (bilateral en el 35%), y en el 20% tienen al menos un anillo carótido-clinoidal (bilateral en el 6%). Cuando está presente, la clinoides media se encuentra en la transición entre la carótida intracavernosa y la paraclinoidea, y cubre el techo antero-medial del seno cavernoso.

La [clinoidectomía media](#) mejora el acceso a la región paraselar (Fernandez-Miranda y col., 2012).

## Bibliografía

Fernandez-Miranda, Juan C, Matthew Tormenti, Fernando Latorre, Paul Gardner, and Carl Snyderman. 2012. "Endoscopic Endonasal Middle Clinoidectomy: Anatomical, Radiological, and Technical Note." *Neurosurgery* (July 16). doi:10.1227/NEU.0b013e3182690b6b. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22806082>.

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea**

Permanent link:

[http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=apofisis\\_clinoides\\_media](http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=apofisis_clinoides_media)

Last update: **2019/09/26 22:21**

