Se usa como screening y herramienta de diagnóstico para los trastornos de salud mental en la depresión, ansiedad.....

La angustia psicológica es frecuente en pacientes con tumores cerebrales y puede ser identificado con éxito utilizando el PHQ-2.

El PHQ-2 tiene una consistencia interna moderada y debe ser considerado para su uso rutinario en pacientes con tumores cerebrales para la detección de angustia psicológica.

The Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2)

Patient Name _____ Date of Visit _____

Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems?	Not At all	Several Days	More Than Half the Days	Nearly Every Day
1. Little interest or pleasure in doing things	0	1	2	3
2. Feeling down, depressed or hopeless	0	1	2	3

Bunevicius, Adomas, Vytenis Deltuva, Sarunas Tamasauskas, Arimantas Tamasauskas, and Robertas Bunevicius. 2012. “Screening for Psychological Distress in Neurosurgical Brain Tumor Patients Using the Patient Health Questionnaire-2.” Psycho-oncology (December 12). doi:10.1002/pon.3237.

From:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/ - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=cuestionario_de_salud_phq

Last update: **2019/09/26 22:17**