

Deformidad craneofacial

Las deformidades del cráneo son conocidas en la historia de la medicina ya desde la antigüedad, si bien no se comienzan a comprender hasta bien entrado el siglo XIX, con autores como Otto y Virchow ¹⁾.

Este último autor establece su relación con el cierre precoz de las suturas craneales, enunciando además la conocida ley de Virchow, que establece que la fusión prematura de una sutura craneal conduce a una disminución del crecimiento óseo en dirección perpendicular a la sutura enferma, con crecimiento compensatorio además en otras suturas. Virchow formula además toda una terminología para denominar a las diversas deformaciones craneales, con términos que todavía se utilizan en su mayor parte.

Esta conocida visión, que responsabilizaba de estas deformaciones a algún proceso patológico cuyo origen estaba en las suturas craneales se ha mantenido hasta Moss en 1975 ²⁾

Tipos

1.-Fisuras del labio y del paladar (labio leporino)

2.-Malformaciones Cráneo-Faciales

A) Fisuras faciales

B) Craneosinostosis

C) Disostosis craneofacial

Microsomía hemifacial

Síndrome de Treacher Collins

3.-Malformaciones de la Orbita:

Hipo e hipertelorismo

Distopía orbitaria

4.-Malformaciones del maxilar y mandíbula.

¹⁾

Esparza J. Las sinostosis craneofaciales. M.D.P. Monografías de Pediatría. Grupo Aula Médica,S.A. Madrid.Barcelona. 1993.

²⁾

Moss ML. Functional anatomy of cranial synostosis. Child's Brain, 1975;1:22-23.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea** ISSN 1988-2661



Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=deformidades_craneofaciales

Last update: **2019/09/26 22:18**