

El [tratamiento quirúrgico](#) del [Chiari tipo 1](#), puede abarcar desde una simple [descompresión suboccipital](#) hasta la [apertura dural](#) y coagulación de la [amígdala cerebelosa](#)...

En todo caso es una [cirugía electiva](#) que de forma excepcional puede presentar un [deterioro](#) tan brusco que requiera una [intervención quirúrgica urgente](#) ¹⁾

Generalmente la [intervención quirúrgica](#) que se practica más frecuentemente consiste en la [descompresión cervical superior](#) y [fosa posterior](#) y/o [duroplastia](#) e incluso algunos eliminan la banda dural.

¹⁾

Pettorini, Benedetta Ludovica, Anna Gao, y Desiderio Rodrigues. 2011. «Acute deterioration of a Chiari I malformation: an uncommon neurosurgical emergency». Child's Nervous System: ChNS: Official Journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery (Abril 7).

doi:10.1007/s00381-011-1442-9. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21472461>.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=descompresion_cervical_superior

Last update: **2019/09/26 22:20**

