

Período de relativa claridad mental entre períodos de irracionalidad, especialmente en los procesos mentales orgánicos como el delirio o la demencia.

Término referido a una evolución clínica que puede presentarse en el [hematoma epidural intracraneal](#), pero no solo exclusivo de este.

Se ha presentado hasta en el 83,3 % de los [traumatismos craneoencefálicos graves](#) en Judo (Nagahiro y col., 2011).

En el 2012 se definió el intervalo lúcido espinal en un paciente que desarrolló paraplejia flácida con un nivel sensorial y retención urinaria tras un intervalo libre tras una raquianestesia (Madhugiri y col., 2012).

Bibliografía

Madhugiri, Venkatesh S, Manish Singh, Gopalakrishnan M Sasidharan, and V R Roopesh Kumar. 2012. "Remote Spinal Epidural Haematoma After Spinal Anaesthesia Presenting with a 'Spinal Lucid Interval'." BMJ Case Reports 2012. doi:10.1136/bcr-2012-007258.

Nagahiro, Shinji, Yoshifumi Mizobuchi, Hideki Hondo, Hidetoshi Kasuya, Takeshi Kamitani, Yuzo Shinbara, Yuji Nimura, and Taisuke Tomatsu. 2011. "[Severe head injuries during Judo practice]." No shinkei geka. Neurological surgery 39 (12) (December): 1139-1147.

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=intervalo_lucido

Last update: **2019/09/26 22:15**

