

MELANOMATOSIS MENÍNGEA PRIMARIA: -DEFINICIÓN: Proliferación maligna de los melanocitos presentes en las meninges. -Es una variante rara del melanoma maligno primario. -En niños, asociado mas frecuentemente con el nevus pigmentario congénito gigante. -Diferencia con la carcinomatosis meníngica: secundaria a tumor en otra localizacion (mama, pulmon, melanoma) -EPIDEMIOLOGÍA: Mas común en adultos que en niños. -CLÍNICA: muy variable y puede simular otros procesos como meningitis, encefalitis virales, leucemias, linfomas...

DIAGNÓSTICO: z Bioquímica LCR: hiperproteíorraquia y/o hipoglucorraquia simuladoras de meningitis. z Citología LCR: alta tasa de falsos negativos. z Marcadores S100 y HMB 45 no proporcionan un diagnostico definitivo. z La RMN cráneo-espinal con contraste demuestra refuerzo leptomeningeo difuso. z La biopsia cerebral o meníngica es, a menudo, la única prueba diagnostica definitiva. z En la mayoría de los casos el diagnóstico es postmortem. **TRATAMIENTO:** Si bien a modo paliativo se proponen radio y/o quimioterapia, el pronóstico es ominoso con una expectativa de vida inferior a 6 meses

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=melanomatosis_meningea

Last update: **2019/09/26 22:11**

