

El nervio fibular profundo o peroneo profundo inerva la piel del pie entre el primer y segundo dedos.

Comienza en la bifurcación del [nervio peroneo común](#), entre el hueso peroné y el músculo peroneo lateral largo en relación cercana con la arteria tibial anterior a la altura media del pie. En la articulación del tobillo, el nervio da dos ramas, uno lateral y otro interno o medial.

El nervio fibular profundo procede del nervio fibular común. Este a su vez procede del gran nervio ciático, que es formado por el plexo lumbosacro (L4-S3).

Inerva a la musculatura anterior de la pierna, que está compuesta de interno a externo por: músculo tibial anterior, músculo extensor largo del dedo gordo, músculo extensor largo de los dedos y el músculo peroneo anterior o 3er peroneo. El músculo peroneo lateral largo y músculo peroneo lateral corto están inervados por el nervio peroneo superficial. En el pie inerva al músculo pedio y el músculo extensor corto del dedo gordo.

La disfunción del nervio tibial anterior es una forma de neuropatía periférica causada por traumatismos o compresión prolongada sobre el nervio y conlleva a pérdida del movimiento o la sensibilidad de la parte inferior de la pierna.

En muchos casos la recuperación es espontánea.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=nervio_peroneo_profundo

Last update: **2019/09/26 22:11**

