

Protocolo Fármacoterapéutico

Historia de [medicamentos](#): Lista de medicamentos actuales y anteriores, dosis, frecuencia y duración del uso.

Fármacos específicos mas usados

[Dexametasona](#)

[Nimodipino](#)

Aerosoles

[Salbutamol](#)

[Ipratropio](#)

Anticoagulantes

[Bemiparina sódica](#)

Anticomiciales

[Levetiracetam](#)

[Valproato](#)

[Fenitoina](#)

[Lacosamida](#)

[Carbamazepina](#)

[Clonazepam](#)

Antihipertensivo

[Captopril](#) (más usado).

[Urapidil](#)

Analgésicos

[Paracetamol](#) y [Metamizol](#)

[Ibuprofeno](#)

[Pregabalina](#)

Parches Oxycodona/Naloxona (Targin®)

[Cloruro mórfico](#)

[Ketorolaco](#)

[Tramadol](#)

Antibióticos

[Vancomicina](#) - [Cefazolina](#) (los mas usados)

[Teicoplanina](#)

[Ciprofloxacino](#) para infección de orina sin germen conocido 400 mg cada 12 horas

[Meropenem](#) para infección respiratoria intrahospitalaria sin germen conocido

Antiemético

[Granisetron](#)

Antitusígeno

Codeisan

Estreñimiento

[Lactulosa](#)

Mucolítico

[Acetilcisteína](#)

Protector gástrico

[Omeprazol](#)

Psicotrópicos

Insomnio

Lorazepam

Diazepam

Agitación

Haloperidol

Sueros

Suero fisiológico (el mas usado).

Suero Glucosado

Suero Glucosalino

Protocolo Fármacoterapéutico de Hemorragia cerebral en planta

Suero Fisiológico 1500 ml. endovenoso con [Cloruro potásico](#) 10 mEq. en cada 500 ml.

[Levetiracetam](#) 500 mg cada 12 horas endovenoso (solo si hay convulsión)

[Omeprazol](#) 40 mg endovenoso

[Paracetamol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Metamizol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Granisetron](#) si precisa endovenoso 1 mg en iny. IV lenta (30 seg)- Dosis máx. 3 mg/día.

[Bemiparina sódica](#) 3500 UI sc cada 24 horas cuando el TAC de control muestre estabilidad.

Protocolo Fármacoterapéutico Hemorragia subaracnoidea en planta

Suero Fisiológico 3000 ml. endovenoso con [Cloruro potásico](#) 10 mEq. en cada 500 ml.

[Levetiracetam](#) 500 mg cada 12 horas endovenoso

[Omeprazol](#) 40 mg endovenoso

[Paracetamol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Metamizol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Granisetron](#) si precisa endovenoso 1 mg en iny. IV lenta (30 seg)- Dosis máx. 3 mg/día.

[Bemiparina sódica](#) 3500 UI sc cada 24 horas cuando el TAC de control muestre estabilidad.

[Nimodipino](#) 60 mg via oral cada 4 horas (o 30 mg cada 2 horas endovenoso si hay bajadas bruscas de tensión arterial).

[Lactulosa](#) sobres cada 12 horas

Protocolo Fármacoterapéutico de Raquis en postoperatorio de hernia discal lumbar simple o hernia discal cervical

[Suero Glucosalino](#) 1500 ml. endovenoso con Cloruro potásico 10 mEq. en cada 500 ml.

[Omeprazol](#) 40 mg endovenoso

[Paracetamol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Metamizol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Granisetron](#) si precisa endovenoso 1 mg en iny. IV lenta (30 seg)- Dosis máx. 3 mg/día.

[Bemiparina sódica](#) 3500 UI sc cada 24 horas

Protocolo Fármacoterapéutico de Raquis (Artrodesis) intervención

[Suero Glucosalino](#) 1500 ml. endovenoso con Cloruro potásico 10 mEq. en cada 500 ml.

[Omeprazol](#) 40 mg endovenoso

[Paracetamol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Metamizol](#) 3 g. en perfusión de 500 ml de [suero fisiológico](#) a 21 ml/hora

[Tramadol](#) 3 amp en la perfusión

[Granisetron](#) si precisa endovenoso 1 mg en iny. IV lenta (30 seg)- Dosis máx. 3 mg/día.

[Bemiparina sódica](#) 3500 UI sc cada 24 horas

Protocolo Fármacoterapéutico Traumatismo Craneoencefálico en planta

[Suero Fisiológico](#) 1500 ml. endovenoso con [Cloruro potásico](#) 10 mEq. en cada 500 ml.

[Omeprazol](#) 40 mg endovenoso

[Paracetamol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Metamizol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Granisetron](#) si precisa endovenoso 1 mg en iny. IV lenta (30 seg)- Dosis máx. 3 mg/día.

Protocolo Fármacoterapéutico de Tumor intracraneal en planta

[Suero Fisiológico](#) 1500 ml. endovenoso con [Cloruro potásico](#) 10 mEq. en cada 500 ml.

[Dexametasona](#) 4 mg. cada 6 horas endovenoso

[Levetiracetam](#) 500 mg cada 12 horas endovenoso

[Omeprazol](#) 40 mg endovenoso

[Paracetamol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Metamizol](#) 1 g. cada 8 horas endovenoso

[Granisetron](#) si precisa endovenoso 1 mg en iny. IV lenta (30 seg)- Dosis máx. 3 mg/día.

[Bemiparina sódica](#) 3500 UI sc cada 24 horas

Protocolo Farmacoterapéutico de analgesia

[Paracetamol](#) 1 gr. endovenoso cada 8 horas

[Metamizol](#) 1 g. endovenoso cada 8 horas

vía oral: de 1 a 2 g cada 8 horas

Vía parenteral: una ampolla de 2 g de metamizol por vía intramuscular profunda o intravenosa lenta (3 minutos) cada 8 horas, salvo criterio médico, sin sobrepasar las 3 ampollas por día. En la indicación de dolor oncológico se utilizará 1/2 -1 ampolla cada 6-8 horas por vía oral, disuelta en naranja, cola o cualquier otra bebida refrescante.

Si persiste dolor:

[Ketorolaco](#) 30 mg endovenoso cada 12 horas

Y si sigue persistiendo dolor:

[Tramadol](#) 50 mg endovenoso cada 8 horas

Y si sigue persistiendo dolor:

Cloruro mórfico 5 mg cada 8 horas sc o 2 mg endovenoso cada 8 horas

ver [Protocolo de analgesia postoperatoria](#)

Protocolo Farmacoterapéutico de antibioterapia preoperatoria

Vancomicina 1 gr. endovenoso a pasar una hora antes de la incisión cutánea

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=protocolo_farmacoterapeutico

Last update: **2023/09/29 21:47**

